

La importancia de la vacunación contra sarampión en el equipo de salud

Actualización brote de sarampión en Chile: 8 de junio de 2015

El personal de salud se encuentra bajo un mayor riesgo de exposición a enfermedades infecciosas y puede ser una de las fuentes propagadoras de un brote tanto hacia otros trabajadores como a pacientes susceptibles. En el caso de sarampión la vacunación es la herramienta más eficaz para evitar este riesgo.

Según la Organización Mundial de la Salud en Europa casi la mitad de los casos ocurridos en los últimos brotes de sarampión del año 2014 se presentaron en el personal de salud.

En Chile, tras tres años sin casos importados (últimas importaciones registradas en 2011), desde mediados de mayo del corriente año a la fecha se han confirmado 4 casos de sarampión en la Región Metropolitana. **Actualmente se encuentran en investigación 8 pacientes que fueron contacto del cuarto caso, un médico con diagnóstico confirmado de sarampión.**

Situación Epidemiológica del Sarampión en Chile^f

Caso 1: hombre de 31 años, residente en Santiago, trabaja en una oficina comercial, antecedente de viaje a China del 4-28 de abril de 2015. Vacunado en la década del 90. Inició exantema el 12/5 y presentó un cuadro atenuado (fiebre leve, triple catarro y adenopatías). El 15/5 se confirmó como sarampión. Se cree que se podría haber contagiado en China o en el vuelo de retorno. No se confirmó genotipo

Caso 2: Lactante de 10 meses, residente en la comuna de María Pinto. No vacunado por edad. Comenzó con exantema el 25/5 y el cuadro fue grave con compromiso respiratorio por lo que se encuentra hospitalizado. No se ha establecido el nexo epidemiológico con el primer caso. Se confirmó el genotipo viral H1, circulante en China.

Caso 3: hombre de 38 años, reside y trabaja en Santiago Centro. Inicia exantema el 1/6. Se determinó genotipo viral H1.

Caso 4: Médico de 44 años reside en la comuna de Las Condes. Inicia exantema el 3/6 y se notifica el 5/6. El 6/6 se confirmó por serología. Se encuentra hospitalizado con buena evolución.

El Ministerio de Salud de Chile continúa con la investigación epidemiológica sin establecerse hasta la fecha nexo epidemiológico entre los casos mencionados.

^fReporte de casos de sarampión. Ministerio de Salud de Chile. Disponible en <http://epi.minsal.cl/>

Ante la confirmación de un cuarto caso de sarampión en Chile en un médico, y teniendo en cuenta que el personal de salud se encuentra bajo un mayor riesgo de exposición a enfermedades infecciosas y de transmitirlas a los pacientes vulnerables, el Ministerio de Salud de la Nación insta al equipo de salud a:

○ **Verificar su esquema de vacunación para sarampión-rubéola:**

- Adultos hasta los 50 años: Deben acreditar DOS DOSIS de vacuna Doble o Triple Viral
- Se consideran inmunes las personas mayores de 50 años y aquellos que cuenten con una prueba de laboratorio que lo corrobore (IgG positiva para sarampión).

- **Intensificar la vigilancia de enfermedades febriles exantemáticas (EFE)** y su notificación oportuna en todos los centros de los subsectores públicos, privados y de la seguridad social.
- Ante un **casos sospechoso** (fiebre y exantema): Informar a la autoridad inmediata superior por el medio disponible, completar la ficha de notificación¹ y realizar la toma de muestra para estudios serológicos y detección viral (orina y/o hisopado naso-faríngeo).

¹ Ficha de notificación de EFE disponible en: <http://www.msal.gov.ar/dinacei/index.php/personal-de-salud/vigilancia/efe>